



# Černý kašel (pertuse neboli dávivý kašel)

**Přenos:** vzdušnou cestou, popř. přes hlenem potřísněné předměty

**Inkubační doba:** 1–3 týdny

- Ohroženy jsou především neočkované děti, pro které může mít toto onemocnění život ohrožující následky.
- Obvykle je onemocnění manifestováno dlouhodobými epizodami dávivého kašle. Nemocný nemůže dodechnout, zajíká se a dává. Občas může docházet i ke zvracení hlenu a promodrávání v obličeji v důsledku nedostatku kyslíku. Ostatní příznaky jsou nespecifické, tedy zaměnitelné s projevy jiných vzduchem přenosných onemocnění. Mezi epizodami kašle se nemocný jeví zdánlivě bez obtíží.
- Nakazit se mohou i očkované děti, průběh onemocnění u nich však bývá většinou lehčí.

## Co dělat, když se u dítěte výše popsané projevy objeví?

- Pokud výše uvedené potíže u dítěte zaznamenáte, navštivte co nejdříve praktického lékaře a informujte jej o možném kontaktu s dávivým kašlem (pertusí).

## Co se bude dít dále?

- Lékař dítěti provede odběr (tzn. výtěr z nosohltanu, popř. odběr krve na zjištění hladiny protilátek). Podle výsledku odběru vás poté poučí o dalším postupu a v případě laboratorně prokázané nákazy zahájí léčbu antibiotiky (Klacid).

## Co dělat, když se u dítěte nákaza dávivým kašlem potvrdí?

- Pokud se onemocnění u Vašeho dítěte potvrdí, informujte prosím školu.
- Ohledně léčby následujte pokyny lékaře.
- V domácnosti je vhodné často větrat a provést dezinfekci ploch a předmětů běžně dostupnými dezinfekčními prostředky proti bakteriím. Doporučit lze též vyprat plyšáky, lůžkoviny a textilii, které mohly být zasaženy hleny.
- V případě potíží u dalšího člena rodiny, opět kontaktujte lékaře. Onemocnění může být nebezpečné pro neočkované děti i oslabené osoby.